

FlexNyt

Indhold

- Sommertid er insekttid
- Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har opdateret vejledningen om direkte arealstøtte
- Antal aktive dyr pr. kvægrace – svagt fald
- Mange nye økologiske biavlere
- Der er mange ulykker med dyr
- Orientering ved udløb af 20-årige MVJ-tilsagn
- Tilskud til privat urørt skov
- Tilskud til at sikre og forbedre biodiversitet i skov
- Tilskud til læhegn og småbeplantninger
- Udbringning af zink på landbrugsjord
- Ny vejledning om gødsknings- og harmoniregler
- Udlæg af kløvergræs i sensommeren
- Oplysninger til gødningsregnskabet er nu tilrettet for slagtekalve
- Regler for omlægning af fodergræs samt jordbehandling af afgrøder forud for vår-sæd

Heste

Sommertid er insekttid

Nu er sommeren kommet, og det er dejligt, men samtidig betyder det også, at insekter, mitter, hestebremser, flåter, myg og fluer er kommet.

Heste får ofte øjenbetændelse om sommeren på grund af fluer, der sætter sig i øjenkrogen. Ofte ses der kun let tåreflod eller minimalt pus i øjenkrogen, men disse milde symptomer kan hurtigt udvikle sig til mere alvorlige lidelser. Hvis der kommer meget tåreflåd fra øjnene, øjenomgivelserne hæver, øjenlågshår, der peger nedad, eller hesten har sammenknebnede øjne, skal dyrlægen tilkaldes. For at afhjælpe generne kan man bruge en fluemaske af net.

Mitter

Mitter er blodsugende insekter, der er til stede fra forår til efterår. Endvidere er de mest aktive i skumringen. Heste kan få en allergisk reaktion af mitternes spyt – dette kaldes sommereksem. På grund af den intense kløe, slides hårene af på man og halerod. Fordi lidelsen skyldes en allergisk reaktion hos den enkelte hest, sker der ingen smitte til andre heste. Det er især islandske heste, der rammes af sommereksem, men det kan også ramme andre ponyer og heste. Der findes ikke nogen sikker behandling mod sommereksem, men man skal sørge for, at hesten går i en fold, som er højtliggende, hvor der er mere vind – helst uden bevoksning og fugtige vandhuller.

Man kan købe forskellige dækkener, som kan forhindre mitterne i at bide. Man kan købe medicin, der lindrer kløen. Den bedste behandling vil dog være at sætte hesten på stald i skumringen, hvor mitterne er mest aggressive.

Hestebremser

Selvom hestebremser hverken stikker eller bider, reagerer hesten ofte voldsomt mod bremsen, der lægger små, gule æg især på hestens ben og man. Hesten får larverne i maven, når den klør sig med tænderne. I hestens mave vokser larverne til næste forår, hvor den forlader hesten med dennes afføring. Det er bedst at behandle mod hestebremselarver i december måned.



Flåter

Antallet af flåter har været stigende de seneste år. Den voksne hunflåt ligger skjult i græs og krat og venter på, at et menneske eller dyr kommer forbi, som den kan bide sig fast i. Derfor er det en god idé at tjekke hesten – og sig selv for flåter.

Flåten kan fjernes med en "flåtfjerner" eller en "tægetang". Der skal gribes om flåtens hoved nede i huden, og flåten fjernes ved, at tangen ubesværet drejes, så hele flåten kommer ud.

Man kan også bruge en pincet, der ligeledes tages om flåtens hoved og enten ved at dreje den rundt eller ved at lave et langt sejt træk forsøge at få den til at slippe sit tag.

Indimellem overfører flåten sygdommen borreliose. Da tidlig rødmen på stedet, hvor flåten har bidt sig fast, ikke kan anvendes hos heste, opdager man som regel først borreliosens, når den har nået det kroniske stadie. Symptomerne kan være gentagne anfaldsvise haltheder, ødemer, betændelse i leddene, hudproblemer, nedsat eller ophørt ædelyst, feber og nedstemthed. Behandling sker som regel med høj dosis af antibiotika.

Myg

Om sommeren udklækkes millioner af myg til megen gene for dyr og mennesker. Nogle folde er mere plaget af insekter end andre, og nogle gange hjælper det at flytte hesten på en anden fold, hvor insektplagen ikke er så voldsom.

De forskellige insekter kan i nogen grad bekæmpes med forskellige sprays og andre produkter til udvortes brug.

Info

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har opdateret vejledningen om direkte arealstøtte

Nogle af reglerne om direkte arealstøtte er blevet ændret, siden vejledningen blev offentliggjort i december 2016. I vejledningen finder du reglerne for grundbetaling, grønne krav, støtte til unge nyetablerede landbrugere og ø-støtte.

Se vejledningen på [Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside](#)

Kvæg

Antal aktive dyr pr. kvægrace – svagt fald

40 forskellige kvægracer er repræsenteret i danske kvægbesætninger.

Der er registreret levende dyr af 40 forskellige malke- og kødkvæg racer i Danmark pr. 1/7-2017. Der er et svagt fald, men trods alt næsten uændret antal kvæg totalt set.

Se fordelingen på racer på [LandbrugsInfo](#)

Biavl

Mange nye økologiske biavlere

Mange nye økologiske biavlere søgte autorisation og fik godkendt deres placeringer af bigårde til økologisk biavl. Der var dog også en del, som fik afslag af forskellige årsager.

I 2016 var der godkendt 59 bistader, og efter årets ansøgningsrunde har 14 biavlere fået godkendt placeringerne af bigårde med i alt 272 bistader. Der er altså det første år med den nye regulering kommet mere end fire gange så mange økologiske bistader. Dermed er der sket en væsentlig stigning i antallet af økologiske bistader. Grunden til, at der er kommet flere steder med økologisk biavl, er, at reglerne er ændret.

Læs mere på [Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside](#), og se, hvor det er muligt at få en godkendelse til økologisk biavl.

Info

Der er mange ulykker med dyr

Arbejdsulykker med dyr involveret topper statistikken, hvad enten det drejer sig om svinebrug eller kvægbrug.

Dyrene er uforudsigelige i deres adfærd, og det kræver, at man til stadighed er opmærksom både på dyrene og i de situationer, hvor der især er en risiko. Pludselige bevægelser fra dyrene er ofte årsag til ulykkerne, ligesom bid og spark giver skader for dem, der arbejder med dyrene.

Læs mere om problemet, og hvordan du kan undgå at komme til skade på [LandbrugsInfo](#)

Orientering ved udløb af 20-årige MVJ-tilsagn

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen sender henover sommeren 2017 brev til de jordejere med 20-årige MVJ-tilsagn, som udløber i 2017 og/eller i 2018. Brevet beskriver muligheder og begrænsninger for arealets videre funktion, afhængigt af om jordejer ønsker at:

1. indgå i et nyt 5-årigt tilsagn; Pleje af græs- og naturarealer
2. benytte arealet som miljøfokusområde (MFO-brak)
3. genopdyrke arealet (nu eller senere).

Brevet er en generel orientering til jordejer, og det indeholder ikke en specifik vejledning for det enkelte tilsagnsareal.

[Du kan læse brevet her](#)

Tilskud til privat urørt skov

Privat urørt skov er en del af aftalen om Naturpakken. Naturpakkens formål er at gøre den danske natur mere robust og ruste naturen mod tilbagegang i naturtyper og biodiversitet. Udpegningen af privat urørt skov skal være omkostningseffektiv og målrettet skove med potentiale for store naturværdier. Tilskuddet kan søges af og ydes kun til private ejere af skov. En privat ejer kan både være en person, et selskab, en fond, forening eller lignende.

Formålet med tilskud til privat urørt skov er at sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov ved at beskytte naturmæssigt værdifulde skovarealer og særlige levesteder for arter tilknyttet skov. Indsatsen baseres på frivillig medvirken fra lodsejere.

Se vejledningen [her](#) (der kan søges fra 3. juli til 3. september 2017.)

Kilde: SEGES

Tilskud til at sikre og forbedre biodiversitet i skov

Tilskud til skov med biodiversitetsformål er en del af aftalen om Naturpakken. Danmark har en forpligtelse til at beskytte truede dyre- og plantearter, og mange af disse arter er knyttet til levesteder i skove. Det er nødvendigt at tage særlige hensyn i skovdriften for at sikre levestederne for biodiversiteten.

Tilskudsordningen kan søges af:

- Private ejere af skov. En privat ejer kan både være en person, et selskab, en fond, forening eller lignende.
- Kommuner med skov i Natura 2000-områderne. Kommuner kan kun søge tilskud til projekter, der har til formål at sikre Natura 2000 skovnaturtyper.

Formålet med tilskud til skov med biodiversitetsformål er at bidrage til at sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov. I skov med biodiversitetsformål tages de nødvendige hensyn ved at skabe muligheder for ekstensiv skovdrift, skovgræsning, bevaring af gamle træer og genetablering af naturlige vandstandsforhold.

Se vejledningen [her](#) (der kan søges fra 3. juli til 3. september 2017)

Kilde: SEGES

Tilskud til læhegn og småbeplantninger

Med Naturpakken fra maj måned 2016 blev det besluttet at yde tilskud til læhegn med 10 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019. Ansøgningsrunden for tilskudsordningen til læhegn og småbeplantninger er åben fra 6. juli til 3. september 2017.

Tilskud til læhegn og småbeplantninger er en del af aftalen om [Naturpakken](#). Der er etableret en national tilskudsordning til etablering af nye læhegn og evt. supplement af eksisterende læhegn i det åbne land. Læhegn kan være værdifulde levesteder for biodiversitet i landbrugslandet og kan være med til at sikre sammenhængende natur og naturlige trædesten i de dyrkede arealer.

Ordningen skal fremme og bevare biodiversiteten i det åbne land gennem plantning af læhegn og småbeplantninger. Ordningen stiller krav til kvaliteten af beplantningerne, og projekterne prioriteres efter størrelse. Tilskudsordningen kan søges af private lodsejere.

Sådan søger du om tilskud

Ansøgning om tilskud til læhegn og småbeplantninger indsendes til Miljøstyrelsen.

Henvendelser om tilskud til læhegn og småbeplantninger kan ske til Miljøstyrelsen på mst@mst.dk eller Miljøstyrelsens [lokale tilskudsenheder](#).

Se vejledningen [her](#).

Kilde: SEGES

Udbringning af zink på landbrugsjord

Med ændringen af bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, der træder i kraft 1. august 2017, er der indført restriktioner for udbringning af husdyrgødning fra smågrise, der tildes medicinsk zink. Restriktionerne er begrundet i at undgå en yderligere ophobning af zink i landbrugsjorden for at undgå en stigning i udledningen til vandmiljøet.

EU-Kommissionen har i foråret 2017 besluttet, at brugen af medicinsk zink skal udfases over en 5-årig periode. Derfor må reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen forventes at være relevante i en kort årrække.

Zink er et essentielt næringsstof. Zinkmangel forekommer normalt ikke i Danmark, men er et stort problem i nogle områder i verden f.eks. Tyrkiet og Iran. Zink forekommer i jorden i forskellige forbindelser. Zink er bundet i lerminerale, hvor det ikke er tilgængeligt. Zink kan desuden være bundet til leroverfladerne, hvor det er i ligevægt med koncentrationen af zink i jordvæsken. Overskudstilførsel af zink resulterer i en immobilisering (meget hårdt bundet) af zink i jorden. Zinkkoncentrationen i jordvæsken og dermed tilgængeligheden af zink aftager med stigende reaktionstal. I dansk jord er det totale zinkindhold i gennemsnit 36 kg zink pr. ha i pløjelaget på sandjord og 96 kg på lerjord.

Kontakt din rådgiver inden udbringning for yderligere rådgivning.

Kilde: Planteavlsorientering 14. juli 2017

Ny vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Ny vejledning om gødsknings- og harmoniregler gældende for planperioden 2017/2018 ligger nu på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside.

I vejledningen beskriver Landbrugs- og Fiskeristyrelsen blandt andet regler vedrørende gødningsregnskabet, gødningsleverancer, brødhvedeordningen, efterafgrøder, dyrkningsrelaterede tiltag, de ændrede harmonikrav og den nye fosforregulering.

Se vejledningen på [Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside](#)

Mark

Udlæg af kløvergræs i sensommeren

Det er meget vigtigt, at udlæg af kløvergræs i efteråret sker til tiden. Hvis græsset sås inden den 10. august, kan man forvente mellem 1.000 og 1.300 FE mere pr. ha, end hvis man venter til omkring 1. september.

De græsmarksblandinger (blandinger mellem græs og kløver), som bedst egner sig til udlæg sidst på sommeren, er blandinger, som har numrene: 20, 22, 35, 42, 43, 45 og 47. (De anbefalede frøblandinger til græsmarker)

Husk, når du køber græsblanding at tage stilling til, hvad græsmarken skal bruges til! Skal den bruges til afgræsning, så er det én af blandingerne 20, 22 eller 35. Skal marken kun bruges til slæt, er det blandingerne 42, 43, 45 eller 47.

Drejer det sig om blandinger til heste, er det blanding 61.

Til får blanding 52 eller 53.

Der er i forbindelse med heste og får tale om afgræsning. Til evt. slæt bruges 42, 43, 45 eller 47, som er udprægede slætblandinger, og som skal høstes mindst 3-4 gange pr. år. Sælger man græsensilage til malkekvæg, vil det typisk være oftere.

Det er vigtigt at græsfrø kun sås i 1-2 cm dybde. Sås frøene dybere, kommer de alt for dårligt op – i nogle tilfælde slet ikke. Når man sår i den rigtige dybde, vil man kunne se op til 10% af frøene i jordoverfladen.

Hvis man sår i sit udlæg i begyndelsen af august, vil det ikke være nødvendigt at så dæksæd (typisk en tynd kornafgrøde), og man vil opnå en bedre græsmark. Kommer man hen i slutningen af august, bør der sås en mindre mængde dæksæd. Det vil sige ca. 30 kg rug eller hvede. Vinterbyg kan anvendes, men kan give problemer med genvækst i foråret, når dæksæden slås af.

Kvæg

Oplysninger til gødningsregnskabet er nu tilrettet for slagtekalve

2016 blev reglerne ændret, således at alle kalve beregnet til opfedning kunne opfattes som slagtekalve, uanset køn. Begrebet tyrekalve og ungtyre forsvandt og er nu erstattet af slagtekalve. Ændringen gælder i Vejledning om Gødskning- og harmoniregler fra 2016/17. Nu er Oplysninger til gødningsregnskabet i udskriften "Antal dyr til fælles indberetning" tilrettet, således at oplysningerne til gødningsregnskabet for planperioden kan trækkes i DMS med de rigtige kategorier.

Hvis en kvie er markeret som slagtekvie, vil alle beregninger af vægt ske med de samme formler som for tyrene. Det er stadig landmandens eget valg, om han vil anse sit hundyr som slagtekvie eller som kvieopdræt. Hvis ikke hundyrerne er markeret som slagtekvie i kvægdatabasen, så tæller de som opdræt. Det er også landmandens egen opgave at sikre, at alle dyr er registreret som ønsket. De automatiske registreringer fanger ikke alle situationer, og nogle af de automatiske registreringer er måske uønskede og skal ændres.

I kvægdatabasen bliver alle kalve født i malkekvægsbesætninger efter en kødkvægstyr dog automatisk markeret som en slagtekvie og vil derfor blive talt med som slagtekalv. De såkaldte tyrekvier (kviekalv hvor tvilling er tyr) bliver også automatisk markeret som slagtekvie.

Alle andre kviekalve forbliver som kviekalve eller kvier. Det betyder, at har man kviekalve, man gerne vil have beregnet som slagtekalve, så skal man selv markere dem som slagtekvier i DMS Dyreregistrering. Tilsvarende kan man fjerne markeringen, hvis der er dyr, man gerne vil have ind i avlen. Det er ikke muligt at lave disse ændringer i Webdyr.

I kødkvægsbesætninger sker der ingen automatisk markering. Derfor skal slagtekalveproducenter, der evt. får kalve fra kødkvægsbesætninger være ekstra opmærksom på at få dyrene registreret som ønsket.

Kilde: SEGES – Kvæg 19/7 2017

Mark

Regler for omlægning af fodergræs samt jordbehandling af afgrøder forud for vårsæd

Fodergræsmarker må som hovedregel ikke omlægges i perioden fra 1. juni til 1. februar. Dog må de omlægges frem til 15. august, hvis de omlægges til fodergræs, vinterraps eller grønkorn med græsudlæg.

Det gælder for virksomheder med en årlig omsætning på over 50.000 kr. fra plante- og/eller husdyravl, og som dyrker et areal på minimum 10 ha, der skal overholde reglerne for omlægning af fodergræs. Det gælder, uanset om virksomheden er tilmeldt Register for Gødningsregnskab eller ej.

Autoriserede økologiske virksomheder er ikke omfattet af reglerne om forbud mod omlægning af fodergræs.

Bemærk, at der også er tidsmæssige regler for jordbehandling forud for etablering af vårsæd. Ved jordbehandling menes alle former for jordbearbejdning – også nedmuldning af halm, overfladiske harvninger, grubning mv.

Kontakt din rådgiver for yderligere oplysninger.