

Rapsjordlopper i efteråret 2018 – registreringsnet

Maja Folmer-Petersen

Skadestærsklen for at bekæmpe rapsjordloppers larve er overskredet i 35 % af lokaliteterne, incl. lokaliteten i Karise. Bekæmpelsen kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet til slut oktober.

Indledning

Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppers larver. Forekomsten af den voksne rapsjordloppe følges via gule fangbakker på ca. 80 lokaliteter i registreringsnettet.

De gule fangbakker siger ikke noget om behovet for bekæmpelse rettet mod de voksne rapsjordloppers gnav i fremspiringsfasen.

Resultater


Den vejledende bekæmpelsestærskel rettet mod larver er en samlet fangst på 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger. Der lægges især mange æg i varme efterår.

Tabel 1 viser fangsten af rapsjordlopper i vores område, som det fremgår, har der været behov for bekæmpelse på 3 lokaliteter.

Tabel 1. Oversigt over udvalgte lokaliteters fangst af rapsjordlopper i efteråret 2018.

Lokalitet	Max. Antal rapsjordlopper pr. fælde over 3 uger	Bekæmpelsens behov	Uge						
			42	41	40	39	38	37	36
Lammestrup	7,5		0	3,5	4	0	0,5	5	1
Lille Skensved	7		0	2	3	2	1	0	0
Ringsted	2							1	1
Soderup	2			0	2	0	0	0	0,5
St. Ebberup	2		0	0,5		0	0	2	0
St. Merløse	0,5			0	0	0,5	0	0	0
Fuglebjerg	35	Ja	2	0		16	21		14
Holeby	6		2	1	3	1	0	0	0
Hyllinge	36	Ja	1	2	13	12	7	17	2
Karise	84	Ja	0		3	7	62	15	0
Klodsskov	13		3	1	1	5	4	4	0
Kællerød-Sorø	5		2	2	1	2	0	1	1
Lungholm	3		1	0	0	0	1	2	0
Ormeslevvej	17		3	0	3	11	3	1	4
Skælskør	6		4	0	2	0	1	1	0
Vester Egesborg	4			0	1		2	1,5	0,5
Vindeby	4		0	0	0	3	0	1	0

Bekæmpelsestærsklen har i efteråret 2018 været overskredet på ca. 35 procent af lokaliteterne i hele landet. Figur 1 viser den summeret fangst over hele efteråret for 2018 sammenlignet med tidligere års fangster.



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008 samt 2013-2018.

Perspektivering

Bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet (1. oktober) og indtil slutningen af oktober. Bekæmpelsestidspunktet er således meget fleksibelt.

Vi anbefaler generelt at bekæmpe mod rapsjordloppers larve, hvis der i registreringsnettet eller egne fangbakker er fanget over 25 lopper summeret over 3 uger.