Havre sorter – Økologisk

Hans Bach-Lauritsen

Poseidon er den kendte sort inden for økologi med et stabilt højt udbytte, men er dog meget modtagelige overfor meldug.

Delfin er en nyere sort, som i de første år har haft et lidt svingende udbytte, og den får ikke meldug.

Indledning

Formålet er at undersøge udvalgte sorters ydeevne under økologiske forhold, samt kvalitets- og dyrkningsegenskaber under normale forhold.

Resultater

Tabel 1 og 2 viser resultaterne for økologisk landsforsøg af havre sorter. Egenskaber og udbytter for 2019 er et gennemsnit af landsforsøg fra 3 lokaliteter i hele landet.

Tabel 1. Havre udbytte fra Økologiske landsforsøg i FHT og (hkg/ha). Kilde sortinfo.

	Fremavlsareal	Landsforsøg			Lokale forsøg (2019)
	2019, ha.	2019	2018	2017	Skælskør
Blanding		47,0	42,3	66,1	43,1
Delfin	453	99	103	95	103
Poseidon	203	103	104	104	108

Blanding 2019: Delfin, Poseidon og Symphony. Blanding 2018: Delfin, Poseidon og Symphony. 2017: Delfin, Poseidon og Symphony.

I tabellen nedenfor ses udvalgte sorters proteinindhold, dyrkningsegenskaber og sygdomsmodtagelighed fra 2019. Som det fremgår, er Poseidon meget modtagelig overfor meldug og bladplet, hvilket gør den nye sort Delfin interessant.

Tabel 2. Udvalgte havresorters dyrkningsegenskaber og sygdomsmodtagelighed, kilde sortinfo.

	Protein	Længde	Lejesæd	Nedknækning	Sygdomsmodtagelighed (0-4)		
	(%)	(cm)	(0-10)	Strå (0-10)	Meldug	Bladplet	Kronrust
Delfin	11,1	103	0	2	0	2	2
Poseidon	10,8	98	0	4	3	2	0

Sygmodtagelighed angives i dækning %

Perspektivering

Begge sorter kan anbefales som foderhavre.